

## ГЛОТКІВКА ЩОГОЛЕВА

*Erpobdella stschegolewi*  
(Lukin et Epstein, 1960)



### Таксономічна належність

Клас — П'явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п'явки (Arhynchobdellida).

### Природоохоронний статус виду

Вразливий.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Чорноморське узбережжя Кавказу, Крим.

### Чисельність і причини її зміни

Чисельність невелика. Причини змін чисельності не встановлені.

### Особливості біології та наукове значення

Невеликі річки.

### Морфологічні ознаки

Тіло звужується до переду від пояса, його передній кінець злегка розширений. Задня присоска вужча ніж тіло, добре розвинена. Тіло вкрите шкіряними сосочками. Забарвлення темно-оливкове. Максимальна довжина тіла 73 мм при ширині 8 мм.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Збереження біотопів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Відомостей немає.



### Основні джерела інформації

Лукін, 1962; Лукин, 1976; Neseemann, Neubert, 1999.

Автор: С.Ю. Утевський  
Фото: С.Ю. Утевський

## ПСЕВДОТРОХЕТА П'ЯТИКІЛЬЧАСТА

*Fadejewobdella quinqueannulata* (Lukin, 1929)



### Таксономічна належність

Клас — П'явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п'явки (Arhynchobdellida).

### Природоохоронний статус виду

Вразливий.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Ростовська обл. та Краснодарський край (Росія). В Україні ареал охоплює Харківську, Дніпропетровську та Чернігівську обл.

### Чисельність і причини її зміни

Одна, рідше дві особини на 5–8 рослин *Sparganium erectum*. Причини зміни чисельності: зникнення та знищення тимчасових водойм, перетворення їх на постійні водо-

йми, які не пересихають. Ворогом є хижа велика псевдокінська п'явка *Haemoris sanguisuga*. Негативним фактором може бути забруднення водойм свинцем з мисливського дробу.

### Особливості біології та наукове значення

Мілкі водойми, які частково або повністю пересихають на початку осені. Істотною умовою для псевдотрохети п'ятикільчастої є наявність вищих водних рослин *Sparganium erectum* та *Sagittaria sagittifolia*. Пазухи їхнього листа, як правило, є притулком для п'явок цього виду.

### Морфологічні ознаки

Тіло широке, потовщене, проте до переду

від пояса поступово звужується. Задня присоска велика. Поверхня тіла гладенька, на спинній стороні є маленькі сосочки. Тіло коричневе або темно-сіре. Довжина тіла до 136 мм при ширині 11 мм.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Збереження біотопів, штучне відтворення.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Відомостей немає.



### Основні джерела інформації


Лукин, 1929; Лукин, 1962; Утевский С.Ю., Гамуля, Утевский А.Ю., 1998; Утевский и др., 2000.

Автор: С.Ю. Утевський  
Фото: С.Ю. Утевський



## П'ЯВКА МЕДИЧНА

*Hirudo medicinalis* Linnaeus, 1758



### Таксономічна належність

Клас — П'явки (Hirudinea), ряд — Беззоботні п'явки (Arhynchobdellida).

### Природоохоронний статус виду

Вразливий.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Зх. та Центральна Європа, Литва. Пн. обл. України.

### Чисельність і причини її зміни

В окремій водоймі популяція може досягати кількох тисяч особин. Причини зміни чисельності: масове виловлювання, забруднення і знищення водойм, меліоративні заходи.

### Особливості біології та наукове значення

Ставки, водойми, що періодично пересихають, заплавні водойми, невеликі озера, річки з повільною течією. Існуванню виду сприяють наявність у водоймі жаб та відвідування його великими ссавцями (великою рогатою худобою та конями); відсутність ворогів — хижої великої псевдокінської п'явки *Haemopis sanguisuga*; наявність сприятливої для відкладання коконів узбережної смуги; достатнє прогрівання води.

### Морфологічні ознаки

Тіло сплюснене, до переду звужується. Поверхня тіла вкрита маленькими сосочками. Забарвлення з характерним малюнком з оранжевих з нерівними краями та темних

смужок. Черевна сторона тіла без темних плям. Довжина тіла — 100–150 см, максимальна — до 25 см.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони


Збереження біотопів, штучне відтворення. Занесена до додатку II CITES, додатку III Бернської конвенції.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Розмножується в неволі в напівпромислових умовах.

### Господарське та комерційне значення

Використовується в медицині: є джерелом цінного препарату — гірудину.




### Основні джерела інформації

Запковене, 1972; Лукин, 1976; Nesemann, Neubert, 1999; Утевський і др., 2008.

Автор: С.Ю. Утевський  
Фото: С.Ю. Утевський

## П'ЯВКА АПТЕЧНА

*Hirudo verbana* Carena, 1820

## Таксономічна належність

Клас — П'явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п'явки (Arhynchobdellida).

## Природоохоронний статус виду

Вразливий.

## Ареал виду та його поширення в Україні

Сх. Середземномор'я, Балкани, Молдова, Краснодарський край (Росія) та Вірменія, пд. України.

## Чисельність і причини її зміни

В окремій водоймі популяція може досягати кількох тисяч особин. Причини зміни чисельності: масовий вилов, забруднення і знищення водойм, меліоративні заходи.

## Особливості біології та наукове значення

Ставки, водойми, що періодично пересихають, заплавні водойми, невеликі озера,

річки з повільною течією. Існуванню виду сприяють наявність у водоймі жаб та відвідування його великими ссавцями (великою рогатою худобою та конями); відсутність ворогів — хижої великої псевдокінської п'явки *Haemopsis sanguisuga*; наявність сприятливої для відкладання коконів узбережної смуги; достатнє прогрівання води.

## Морфологічні ознаки

Тіло сплющене, до переду звужується. Поверхня тіла вкрита маленькими сосочками. Забарвлення з характерним малюнком з оранжевих з нерівними краями та темних смужок. Черевна сторона тіла з темними плямами. Довжина тіла 100–140 мм. Ширина близько 20 мм.

## Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Збереження біотопів, штучне відтворення.

## Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Розмножується у неволі в напівпромислових умовах.

## Господарське та комерційне значення

Використовується в медицині: є джерелом цінного препарату — гірудину.



## Основні джерела інформації

Лукин, 1976; Neseemann, 1999; Утевский и др., 2000.

Автор: С.Ю. Утевський  
Фото: С.Ю. Утевський



## ТРОХЕТА ПОТАЙНА

*Trocheta subviridis* Dutrochet, 1817



### Таксономічна належність

Клас — П'явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п'явки (Arhynchobdellida).

### Природоохоронний статус виду

Зникаючий.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Англія, Франція, Італія, Угорщина та Румунія. В Україні зареєстровано у заплаві Дністра.

### Чисельність і причини її зміни

Чисельність не встановлена. Причини зміни чисельності: меліорація і забруднення водойм.

### Особливості біології та наукове значення

Невеликі, переважно проточні водойми. Може глибоко проникати у сиру землю, де ловить земляних черв'яків.

### Морфологічні ознаки

Тіло сильно звужене в напрямку до переднього кінця. Передня третина тіла має майже циліндричну форму, в напрямку до заднього кінця все більше сплющується. Задня присоска середньої величини. Забарвлення тіла — від темно-сірого до чорно-коричневого. Максимальна довжина — 150–163 мм, ширина — 10 мм.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Збереження біотопів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Відомостей немає.



### Основні джерела інформації

Прендель, 1923; Лукін, 1962; Лукін, 1976.

Автор: С.Ю. Утевський  
Фото: С.Ю. Утевський

## ТРОХЕТА БИКОВСЬКОГО

*Trocheta bykowskii* Gedroyc, 1913



### Таксономічна належність

Клас — П'явки (Hirudinea), ряд — Безхоботні п'явки (Arhynchobdellida).

### Природоохоронний статус виду

Вразливий.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Альпи, Карпати, Апенніни, Пд.-зх. Німеччина, Пд.-сх. Польща, Словенія, Хорватія. В Україні ареал виду охоплює Івано-Франківську, Тернопільську, Закарпатську обл. та Крим.

### Чисельність і причини її зміни

У деяких водоймах чисельність може бути значною. Причини зміни чисельності: забруднення та знищення водойм.

### Особливості біології та наукове значення

Живе в гірських потоках, струмках та невеликих річках.

### Морфологічні ознаки

Тіло дуже видовжене, відношення ширини тіла до довжини 1 : 14. В передній частині тіло циліндричне. Задня присоска невелика. Поверхня тіла гладенька. Забарвлення світло-сіре з помітним жовтуватим відтінком. Довжина — 100–140 мм.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Збереження біотопів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Відомостей немає.



### Основні джерела інформації

Лукин, 1929; Лукин, 1962.

Автор: С.Ю. Утевський

Фото: С.Ю. Утевський