


## СТАВКОВИК БУЛОВОПОДІБНИЙ

*Lymnaea clavata* Westerlund, 1885



### Таксономічна належність

Клас — Червоні (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).

### Природоохоронний статус

Рідкісний.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Пд. Франція, Пн. Африка, річки Балтійського моря. В межах України знайдено лише в р. Зх. Буг.

### Чисельність і причини її зміни

Чисельність виду дуже низька. За наявними даними — приблизно 1 особина на 20 м<sup>2</sup>. Фактори, які впливають на численність, не досліджені, оскільки вид зустрічається в межах всього ареалу доволі рідко.

### Особливості біології та наукове значення

Вид мешкає на зануреній вищій водній рослинності на невеликій глибині у прибережжі проточних та стоячих водойм.

### Морфологічні ознаки

Черепашка башнеподібна, доволі міцна, з 6–6,5 слабо здутими обертами, які розділені помірно глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 2,5–2,6 рази. Останній оберт складає близько 0,6 висоти черепашки. Поверхня черепашки шорстка, але без оформленої скульптури, має лише чіткі лінії зупинки наростання. Устя загострено-яйцеподібне, його висота складає 0,4 висоти всієї черепашки. Пупок у вигляді доволі широкої, але короткої щілини. Висота черепашки — 22–25 мм, довжина —

до 25 мм.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**  
Відомостей немає.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**  
Не здійснювалися.

**Господарське та комерційне значення**  
Вид, можливо, має значення як проміжний хазяїн паразитичних червів.




### Основні джерела інформації

Круглов, Старобогатов, 1981; Березкина, Старобогатов, 1988.

Автор: В.В. Аністратенко  
Малюнок: Я.І. Медловська

## СТАВКОВИК ПОТОВЩЕНИЙ

*Lymnaea pachyta* Westerlund, 1890



### Таксономічна належність

Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).

### Природоохоронний статус

Рідкісний.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Дельта Волги у прибережжі острова Бухтовий. В межах України знайдено лише в Криму.

### Чисельність і причини її зміни

Точних даних про чисельність виду немає. Фактори, які впливають на численність, не вивчено, оскільки вид зустрічається дуже рідко.

### Особливості біології та наукове значення

Вид населяє занурену вищу водну рослинність на невеликій глибині у прибережжі проточних та стоячих водойм, в тому числі ті, які часто пересихають влітку та калюжі.

### Морфологічні ознаки

Черепашка невелика, високо-конічної або яйцеподібно-конічної форми, помірно тверда. Обертів — до 6, вони сильно здуті (майже ступінчасті), розділені глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 1,7 рази. Останній оберт складає близько 0,8 висоти черепашки. Поверхня черепашки лискуча, з тонкими лініями наростання. Устя яйцеподібне, його висота складає 0,5 висоти всієї черепашки. Пупок

повністю закритий. Висота черепашки — до 11,5 мм, довжина — 20–25 мм.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Збереження біотопів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Не здійснювалися.

### Господарське та комерційне значення

Вид, можливо, має значення як проміжний хазяїн паразитичних червів.



### Основні джерела інформації

Старобогатов, Круглов, 1981.

Автор: В.В. Аністаренко

Малюнок: М.В.Швидка

## ТУРИКАСПІЯ ЛІНКТА

*Turricaspia lincta* Milashevich, 1908**Таксономічна належність**

Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Picoi-подібні (Rissoiformes).

**Природоохоронний статус**

Рідкісний.

**Ареал виду та його поширення в Україні**

Поширений в гирлах великих річок, лиманах і прибережних озерах Північно-Зх. Причорномор'я. Ендемік Азово-Чорноморського басейну.

**Чисельність і причини її зміни**

Вид формує постійні популяції невеликої щільності (зазвичай від 2 до 30 особин на 1 м<sup>2</sup>). До різкого зменшення чисельності

або навіть повного знищення виду може призвести замулення та забруднення води, значне падіння рівня води в дельтах річок і лиманах внаслідок зарегулювання і забирання води на господарські потреби.

**Особливості біології та наукове значення**

Молюски населяють неглибокі ділянки річок, мешкають на щільних ґрунтах (піску, глині та ін.) з помірною кількістю мулу. Максимальна солоність, при якій вид зустрічається в Дніпровсько-Бузькому лимані — 8 ‰.

**Морфологічні ознаки**

Черепашка овально-башнеподібна, струнка, з 8–8,5 помірно здутими обертами, які

розділені доволі глибокою сутурою (швом). Висота черепашки перевищує її ширину в 2,7 раза. Останній оберт складає майже половину висоти черепашки. Скульптура складається лише з чітких ліній наростання. Устя овальне, дещо скошене. Висота черепашки більша за висоту устя в 3,5–3,7 рази. Пупок закритий. Висота черепашки — 10–11 мм, ширина — до 4 мм.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**

Збереження біотопів.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**

Не здійснювалися.

**Господарське та комерційне значення**

Вид має певне значення для господарства як складовий елемент харчового раціону риби та деяких навколотоводних птахів.

**Основні джерела інформації**


Алексенко, Старобогатов, 1987; Алексенко, 1992; Анистратенко, Алексенко, 1994; Анистратенко, Стадниченко, 1995.

Автор: В.В. Анистратенко

Фото: В.В. Анистратенко





**ОКСИХІЛЮС КОБЕЛЬТА***Oxychilus kobelti* (Lindholm, 1910)**Таксономічна належність**

Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).

**Природоохоронний статус**

Вразливий.

**Ареал виду та його поширення в Україні**

Гірський Крим.

**Чисельність і причини її зміни**

1–2 особини на 1 м<sup>2</sup>. Причини зміни чисельності: підвищений антропогенний прес на біотопи.

**Особливості біології та наукове значення**

Вид мешкає в дубових та букових лісах (переважно пралісах).

**Морфологічні ознаки**

Черепашка прижата, червоно-рогова, з 5,5–6,0 обертами, з дуже вузьким пупком (близько 1/10–1/15 ширини черепашки) та спіральною мікроскульптурою (помітною при збільшенні у 10–15 разів). Висота черепашки — 7–7,3 мм, її ширина — 14–17,5 мм.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**

Збереження біотопів.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**

Не здійснювалися.

**Господарське та комерційне значення.**

Відомостей немає.

**Основні джерела інформації**

Лихарев, 1952; Голиков, Старобогатов, 1988.

Автор: О.О. Байдашніков

Фото: О.О. Байдашніков

## ГРАНАРІЯ ЗЕРНОВА

*Granaria frumentum* (Draparnaud, 1801)**Таксономічна належність**

Клас — Червононогі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).

**Природоохоронний статус**

Рідкісний.

**Ареал виду та його поширення в Україні**

Гори Європи від Зх. Карпат до Балкан і Альп. Дуже рідко зустрічається в Українських Карпатах та на зх. Поділля.

**Чисельність і причини її зміни**

У головних біотопах — приблизно 10–15 особин на 1 м<sup>2</sup>. Причини зниження чисельності: антропогенний тиск на біотопи в рекреаційних зонах.

**Особливості біології та наукове значення**

Мешкає на вапнякових скелях на безліссі.

**Морфологічні ознаки**

Черепашка широко-веретеноподібна, рогового кольору, з 8–9 обертами та внутрішнім армуванням останнього оберту, добре помітним з устя. Висота черепашки — 7,5–9,5 мм, її ширина — 2,8–3,5 мм.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**

Збереження біотопів.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**

Не здійснювалися.

**Господарське та комерційне значення**

Відомостей немає.

**Основні джерела інформації**

Шилейко, 1984; Голиков, Старобогатов, 1988.

Автор: О.О. Байдашніков

Фото: О.О. Байдашніков

**СЕРУЛІНА ЗУБЧАСТА***Serrulina serrulata* (L. Pfeiffer, 1874)**Таксономічна належність**

Клас — Черевоногі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).

**Природоохоронний статус**

Вразливий.

**Ареал виду та його поширення в Україні**

Майже циркумпонтичний, диз'юнктивний. Дуже рідко — в Українських Карпатах.

**Чисельність і причини її зміни**

У головних біотопах — приблизно 1–3 особини на 1 м<sup>2</sup>. Причини зміни чисельності: вид мешкає серед гниючої деревини, яка вибирається з лісів, у тому числі на території природоохоронних об'єктів.

**Особливості біології та наукове значення**

Вид мешкає в букових пралісах на вапнякових грядках.

**Морфологічні ознаки**

Черепашка ребриста, веретеноподібна, брудно-жовтого кольору, з 10–12 обертами, з зубчастими краями устя. Висота черепашки — 12–14,5 мм, її ширина — 3,3–3,6 мм.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**

Збереження біотопів.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**

Не здійснювалися.

**Господарське та комерційне значення**

Відомостей немає.

**Основні джерела інформації**

Лихарев, 1962; Голиков, Старобогатов, 1988.

Автор: О.О. Байдашніков

Фото: О.О. Байдашніков



## ХОНДРИНА ВІВСЯНА

*Chondrina avenacea* (Bruguiere, 1792)**Таксономічна належність**

Клас — Червононогі (Gastropoda), ряд — Легеневі (Pulmonata).

**Природоохоронний статус**

Рідкісний.

**Ареал виду та його поширення в Україні**

Гори Європи від Зх. Карпат до Альп і Піренейв. Дуже рідко в Українських Карпатах.

**Чисельність і причини її зміни**

У головних біотопах — приблизно 10–20 особини на 1 м<sup>2</sup>. Причини зниження чисельності: антропогенний тиск на біотопи в рекреаційних зонах.

**Особливості біології та наукове значення**

Вапнякові скелі на безлісці.

**Морфологічні ознаки**

Черепашка з великими зморшками (але не ребрами), високо-конічна, темно-коричнева з трохи блакитним віддтінком, з 7,5–8 обертами та внутрішнім армуванням останнього оберту, добре помітним з устя. Висота черепашки — 6,5–7,7 мм, ширина — 2,5–2,8 мм.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**

Збереження біотопів

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**

Не здійснювалися.

**Господарське та комерційне значення**

Відомостей немає.

**Основні джерела інформації**

Шилейко, 1984; Kerney, Cameron, Jungbluth, 1983; Голиков, Старобогатов, 1988.

Автор: О.О. Байдашніков

Фото: О.О. Байдашніков