

## ЗЛИНКА АЛЬПІЙСЬКА

*Erigeron alpinus* L.

Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae  
(Compositae)

**Природоохоронний статус виду**  
Рідкісний.

### Наукове значення

Європейсько-середземноморський високогірний (субальпійський) вид з диз'юнктивним ареалом.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Гори Європи: Піреней, Альпи, Скандинавські гори, Апенніни, гори Балканського п-ва, Карпати, Кавказ, Мала Азія. В Україні — дуже рідко в Карпатах на хребтах Свидовець (схили гір Близниця-Драгобрат, Герешаска, Ребро), Чорногора (г. Данцер), у Чивчинах (гг. Чивчин, Прелука) і Мармароських Альпах (гг. Нене́ска, Піп Іван). Адм. регіони: Ів, Зк.



### Чисельність та структура популяцій

Найбільші популяції на г. Прелука — кілька тисяч особин на площі 2 га, і на г. Ребро — близько 400 особин на площі 0,3 га. Решта популяцій представлені лише десятками дорослих особин, а їхня загальна чисельність не перевищує 100 особин. Успішно поновлюється насінням.

### Причини зміни чисельності

Надмірне випасання, гербаризація та природні порушення оселищ.

### Умови місцезростання

Субальпійський та альпійський пояс у межах висот 1450–1800 м н. р. м., на скелях, стрімких кам'янистих слабкозадернованих, рідше лучних пологіх схилах переважно східної експозиції, на свіжих, переважно кальце-

вісних ґрунтах. Трапляється в асоціації *Saxifrago-Festucetum versicoloris* (союз *Festuco saxatilis-Seslerion bielzii*). Ксеромезофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 10–30 (40) см заввишки. Стебла поодинокі або нечисленні, шорсткоопушені. Листки притиснуто волосистоопушені. Стеблові листки видовжено-оберненояцеподібні до ланцетних. Середні й верхні стеблові листки сидячі на звуженій основі. Кошики на верхівках стебел і на кінцях гілочок, нечисленні, від 1 до 10 (15), великі, 1,5–2,5 см діаметром. Зовнішні язичкові квітки у кошику вдвічі довші за серединні, простерті. Цвіте у липні–серпні, плодоносить у вересні–жовтні. У межах виду

виділяють 2 підвиди. *E. alpinus* L. subsp. *alpinus* у Чивчинах (г. Прелука), Мармароських горах (г. Піп Іван), на Свидовці (Герешаска). *E. alpinus* L. subsp. *intermedius* (Schleich.) Pawł. поширений у Чорногорі, на Свидовці (г. Ребро) і Мармароських горах (г. Нене́ска).

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється у Карпатському НПП і Карпатському БЗ. Урочище Герешаска-Ребро (Свидовець) необхідно приєднати до заповідного масиву. Потрібно культивувати вид у ботанічних садах, проводити моніторинг популяцій. Заборонено гербаризацію, збирання рослин, надмірне випасання.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне, ґрунтотвірне.

### Основні джерела інформації

Малиновський, Крічфалушій, 2002; Царик, Жилієв, Кияк та ін., 2004; Чопик, 1976; Flora Polska, 1971; Hegi, 1906.

Автор: В.Г.Кияк  
Фото: О.О. Кагало



## ЗЛИНКА ЗАЛОЗИСТА

*Erigeron atticus* Vill.

Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae)

**Природоохоронний статус виду**  
Зникаючий.

### Наукове значення

Рідкісний, диз'юнктивно поширений на межі ареалу.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Пд.-середньоевропейський високогірний вид, що трапляється у Піренеях, Альпах, Карпатах та горах пн. частини Балканського п-ва. В Україні відомий з єдиного оселища в Українських Карпатах на г. Данцир у Чорногорі. Адм. регіон: Ів.

### Чисельність та структура популяцій

Популяція дуже малочисельна й перебуває у критичному стані, представлена лише кількома генеративними особинами.

### Причини зміни чисельності

За останні десятиліття популяція істотно зменшилася, що спричинене поступовим посиленням затінення внаслідок природного заростання оселища гірськососновим та зеленівільховим криволіссям.

### Умови місцезростання

На добре інсольованих пісковикових скелях на сх. схилі г. Данцир на висоті 1530 м н. р. м. Угруповання належить до порядку *Seslerietalia albicantis*. Субстрат містить домішки карбонатів. Петрофіт, кальцефіл.



### Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна короткокореневищна рослина, з 1–2 генеративними пагонами 20–40 см заввишки й кількома вегетативними розетками. Листки обернено-яйцеподібні, гострокінцеві, 5–12 см завдовжки. Квітконосні пагони висхідні, борознисті, рясно улишені, розгалужені у верхній частині. Суцвіття щиток або щиткоподібна волоть, що складається з 3–20 кошиків 14–23 мм діаметром. Квітки трьох типів: зовнішні — язичкові, проміжні — тонкотрубчасті та внутрішні — товстотрубчасті. Язички пурпурово-фіолетові, на 2,5–3 мм довші від трубчастих квіток. Сім'янки ребристі, 3 мм завдовжки. Рослина, особливо листочки обгортки, рясно вкрита коротким

залозистим опушенням з незначною домішкою довгих незалозистих волосків. Цвіте наприкінці липня — на початку серпня, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Оселище розташоване у заповідній зоні Карпатського НПП. Для його збереження варто проводити вибіркоче прорідження чагарникової рослинності. Заборонено гербаризацію, збирання рослин, порушення умов зростання.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне.

### Основні джерела інформації

Kozij, 1936.



Автор: Ю.Й. Кобів  
Фото: Ю.Й. Кобів

## ЮРИНЕЯ ТАЛІЄВА

*Jurinea talievii* Klokov  
(*J. cretacea* auct. non Bunge)

Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae  
(Compositae)

**Природоохоронний статус виду**  
Недостатньо відомий.

**Наукове значення**  
Ендемічний вид, дуже близький до *J. cretacea*  
Bunge.

**Ареал виду та його поширення в Україні**  
Сх.-причорноморський ендемік. В Україні —  
в басейні р. Сіверський Донець (по рр. Крас-  
на, Айдар, Деркул, Комишна). Адм. регіони:  
Дц, Лг.

**Чисельність та структура популяцій**  
Популяції нечисленні, приурочені до вихо-  
дів крейди, їх структура не досліджена.

**Причини зміни чисельності**  
Природно-історична рідкісність, випас худо-  
би, пожежі.

**Умови місцезростання**  
Бідні, сухі крейдиані відшарування, кам'янисті  
схили. Угруповання кл. *Helianthemo-Thyme-*  
*tea*. Петрофіт. Ксерофіт.

**Загальна біоморфологічна характеристика**  
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина,



20–95 см заввишки. Має потужний каудекс і  
стрижневу кореневу систему. Стебла пооди-  
нокі, білуваті від повстисто-павутинистого  
опушення, звичайно розгалужені. Листки пір-  
чаторозсічені, повстисто-павутинисті, зіспо-  
ду білуваті, зверху сіруваті або зеленкуваті,  
стеблові листки сидячі, з розширеною осно-  
вою, що збігає на стебло, утворюючи коро-  
тенькі вузькі крила. Сегменти листків з дуже  
загорнутими на нижній бік краями, по краю  
хвилясті. Кошики по (1)2–8 на стеблі, обгорт-  
ка кошиків напівкуляста, білувата від густого  
повстистого опушення, листочки обгортки  
загострені, притиснуті, зовнішні та серед-  
ні — з відігнутою назовні верхівкою. Квітки  
пурпурові або рожеві. Сім'янки чотиригран-  
ні, дрібногорбочкуваті, темно-бурі зі світлі-

шими ребрами, чубок легко відпадає. Цвіте у  
травні–липні. Плодоносить у липні.

**Режим збереження популяцій та заходи  
з охорони**  
Охороняється рішенням Луганської облас-  
ної ради. Необхідно дослідження стану по-  
пуляцій, виявлення усіх місцезнаходжень  
для створення об'єктів ПЗФ, введення у  
культуру. Заборонено порушення умов міс-  
цезростання виду, розробку кар'єрів, надмір-  
не випасання худоби.

**Розмноження та розведення у спеціально  
створених умовах**  
Відомостей немає.

**Господарське та комерційне значення**  
Декоративне.

**Основні джерела інформації**  
Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк,  
Остапко, 1990; Кондратюк, Тарабрин, Бакланов  
та ін., 1980; Маслоva, Лесняк, Мельник, Перегрим,  
2003; Остапко, 2001, 2005; Флора СРСР, 1962; Фло-  
ра УРСР, 1962.

Автори: В.М. Остапко, Г.С. Назаренко  
Фото: В.М. Остапко



## СЕРПІЙ ДОНЕЦЬКИЙ (КЛЯЗЕЯ ДОНЕЦЬКА)

*Klasea donetzica* (Dubovik) J.Holub (*K. radiata* (Waldst. et Kit.) Á.Löve et D.Löve subsp. *donetzica* (Dubovik) L.Martins; *Serratula donetzica* Dubovik)

Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae (Compositae)

Природоохоронний статус виду  
Рідкісний.

### Наукове значення

Ендемік Дніпровсько-Донецького регіону.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Пн.-причорноморський вид. Басейн Сіверського Дінця та Самари. Адм. регіони: Дн, Лг.

### Чисельність та структура популяцій

Локальні популяції нечисленні (окол. с. Попівка Краснодонського р-ну, с. Стрільцівка Міловського р-ну, с. Провалля Свердловського р-ну, с. Булахівка Павлоградського р-ну), їх структуру не вивчено.

### Причини зміни чисельності

Антропогенний вплив: порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, видобування крейди, випасання худоби.



### Умови місцезростання

Крейдяні відшарування, кам'яністі схили. Угрупування кл. *Festuco-Brometea*, *Helianthemo-Thymetea*. Ксерофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Короткокореневищна трав'яна рослина 40–80 см заввишки з прямостоячим майже голим або розсіяно опушеним не розгалуженим стеблом, зрідка стебел 2–3, що несуть один кошик. Листки пірчаторозсічені, з 12–32 лінійними негусто опушеними сегментами однакової довжини. Зовнішні та середні листочки обгортки на верхівці з вістрям 2–5 мм завдовжки. Квітки рожево-пурпурові, 25–30 мм завдовжки. Сім'янки з рудуватим чубком. Цвіте у травні–липні,

плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Рекомендується створити заповідні об'єкти у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення місцезростань виду, розробка кар'єрів, випасання худоби.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

### Господарське та комерційне значення

Кормове, декоративне.



### Основні джерела інформації

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Остапко, 1990; Морозюк, 1971; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Тарасов, 2005; Флора УРСР, 1965; ЧКУ, 1996; Martins, 2006.

Автор: В.М. Остапко

Фото: О.С. Мандзюк, Т.В. Степаненко