

## СЕРПІЙ ДОНСЬКИЙ (КЛЯЗЕЯ ДОНСЬКА)

*Klasea tanaitica* (P.Smirm.) J.Holub  
(*K. radiata* (Waldst. et Kit.) Á.Löve et D.Löve  
subsp. *tanaitica* (P.Smirm.) L.Martins;  
*Serratula tanaitica* P.Smirm.)

Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae  
(Compositae)

Природоохоронний статус виду  
Рідкісний.

Наукове значення  
Донський ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні  
Басейн Сіверського Дінця, Нижній Дон (Волгоградська обл.). В Україні — на крайньому сході в басейні р. Комишної. Адм. регіон: Лг.

Чисельність та структура популяцій  
Відомо три популяції, чисельність незначна, структура популяцій не досліджена.

Причини зміни чисельності  
Природно-історична рідкісність та надмірне випасання худоби.

Умови місцезростання  
Сухі крейдянні відшарування та задерновані схили. На межі угруповань кл. *Festuco-Brometea* та *Helianthemo-Thymetea*. Мезоксерофіт.



Загальна біоморфологічна характеристика  
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з коротким кореневищем, від якого підіймаються 1–2 прямостоячі, не розгалужені, голі або майже голі стебла, 40–100 см заввишки. Листки нижні довгочерешкові, верхні короткочерешкові, від глибокопідчатороздільних до підчаторозсічених, по краю дрібно-пилчасто-щетинисті, на поверхні голі. Кошики поодинокі, 25–30 мм завдовжки. Листочки обгортки тонко загострені, без помітного вістря на кінці. Квітки рожево-пурпурові. Сім'янки з рудуватим чубком. Цвіте у травні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням і вегетативно (кореневищем).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні «Стрільцівський степ» Луганського ПЗ, ботанічному заказнику місцевого значення «Стрільцівка». Необхідно виявити всі місцезнаходження та створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення умов місцезростання виду, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення  
Декоративне.

Основні джерела інформації

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1965; ЧКУ, 1996; Martins, 2006.

Автор: В.М. Остапко  
Фото: В.М. Остапко



## ЛАГОЗЕРИС ПУРПУРОВИЙ

*Lagoseris purpurea* (Willd.) Boiss.  
(incl. *L. callicephal*a Juz., *L. robusta* Czer.;  
*Crepis purpurea* (Willd.) M.Bieb.)

Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae  
(Compositae)

Природоохоронний статус виду  
Вразливий.

Наукове значення  
Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні  
Крим. У горах та передгір'ях. Адм. регіон: Кр.

### Чисельність та структура популяцій

Локальні популяції незначні за розмірами, нечисельні. У межах локалітетів зростає невеликими групами. В оптимальних умовах щільність значна.

### Причини зміни чисельності

Стенотопність і слабка конкурентна здатність виду.

### Умови місцезростання

Кам'яністі відшарування карбонатного типу (крейда, мергель, вапняки), обриви, осипи. Ценофоб. Угруповання належать до порядку *Alyso-Sedetalia*. Ксерофіт. Карбонатofil.

Загальна біоморфологічна характеристика  
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рос-



лина 10–50 см заввишки. Каудекс потовщений, здерев'янілий, у верхній частині розгалужений. Стебла до 2 мм у діаметрі, прямостоячі, вилчасто розгалужені, безлисті. Листки до 10 см завдовжки та 1,5 см завширшки, у прикореневій розетці, оберненоланцетні, глибокопирчаторозсічені, сіруваті, опушені. Кошики (один або кілька) 1,5–2 см у діаметрі. Квітки пурпурові або рожеві. Сім'янки з 10 реберцями і чубком. Цвіте у червні–липні. Плодоносить у серпні–вересні. Розмножується насінням.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони


Занесений до Європейського червоного списку (як два види: *L. purpurea* та *L.*

*callicephal*a) та Червоного списку МСОП (*L. purpurea*). Охороняється в Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ, заказнику загальнодержавного значення «Куболач» і на території пам'ятки природи загальнодержавного значення «Ак-Кая». Необхідно закартувати місцезростання, контролювати стан популяцій. Заборонено знищення місць існування, заліснення схилів, розробку кар'єрів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Нікітському ботанічному саду — ННЦ УААН.

Господарське та комерційне значення  
Декоративне, протиерозійне.



### Основні джерела інформації

Каталог рідких, исчезающих и уничтожаемых растений флоры Крыма, рекомендуемых для заповедной охраны, 1975; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Дидух, 1980.

Автор: Я.П. Дідух  
Фото: С.О. Свірин

## КОРОЛИЧКА ПІЗНЯ

*Leucanthemella serotina* (L.) Tzvelev.  
(*Chrysanthemum serotinum* L., *Leucanthemum serotinum* (L.) Stank, *Tanacetum serotinum* (L.) Sch. Bip.)

Родина Айстрові (Складноцвіті) — Asteraceae  
(Compositae)

**Природоохоронний статус виду**  
Зникаючий.

**Наукове значення**  
Подунайсько-паннонський ендемік з диз'юнктивним поширенням на пн. межі ареалу.

**Ареал виду та його поширення в Україні**  
Пд.-Сх. Європа. В Україні — на Закарпатській низовині в заплаві р. Латориця (від с. Драгinya до державного кордону), уздовж стариць р. Тиса в околицях м. Чоп, у дельті Дунаю. Вказується для Полісся (Київська обл., с. Поліське, берег р. Уж). Адм. регіони: ?Кв, Зк, Од.

**Чисельність та структура популяцій**  
На Поліссі потребує підтвердження. Стан популяцій дунайського локалітету невідомий. У заплаві р. Латориці спорадично трапляється поодинокими особинами й невеликими мікролокусами, з чисельністю до кількох сотень особин. Популяційні параметри не досліджені.

**Причини зміни чисельності**  
Осушення та розорювання заплавлених лук, вирубування заплавлених лісів та зміна їх гідрологічного режиму через зарегулювання русел річок.

**Умови місцезростання**  
Росте в заплавах на періодично затоплюваних ділянках. У Закарпатті—по окраїнах і на розріджених ділянках заплавлених лісів, а також на високотравних мокрих і болотистих осокових луках в угрупованнях союзів



*Phragmition communis*, *Magnocaricion elatae*. У дельті Дунаю витримує незначне засолення ґрунтів, в угрупованнях кл. *Phragmiti-Magnocaricitea*. Мезогірофіт.

**Загальна біоморфологічна характеристика**  
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 30–150 см заввишки, з довгим розгалуженим кореневищем. Стебло пряме, слабо розгалужене, до самих кошиків улишене. Листки цілісні, сидячі, почергові, довгастоланцетні, при основі з вушками, нижні — 2–4 зарубчасті, середні — віддалено-пильчато-зубчасті, верхні — цілокраї. Кошики поодинокі, 35–60 мм діаметром, на верхівках гілок, утворюють негустий щиток. Крайові обгортки жовтувато-біло-зелені. Крайові

язичкові квітки 10–25 мм завдовжки, білі, довші за обгортки. Сім'янки 2–3 мм, тупі, з 8–10 реберцями. Цвіте в серпні–жовтні. Розмножується насінням та вегетативно.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**  
Охороняється в Дунайському БЗ та у Великодоброньському зоологічному заказнику на Закарпатті. Занесений до Червоного списку рослин Закарпатської обл. Необхідне заповідання прирічкового заплавного комплексу р. Латориця та стариць р. Тиса, моніторинг популяцій і запровадження в культуру. Заборонено зміну гідрологічного режиму заплавлених лук, вирубування лісів.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**  
Відомостей немає, хоча потенційно можливе культивування.

**Господарське та комерційне значення**  
Декоративне.

**Основні джерела інформації**  
Дубина, Шеляг-Сосонко, Жмуд, 2003; Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 1999; Флора УРСР, 1962; Maglocký, Vágenknecht, 1999; Margittai, 1933.

Автори: Р.Я. Кіш, І.М. Данилик  
Фото: Я.П. Дідух



## БІЛОТКА АЛЬПІЙСЬКА, ЕДЕЛЬВЕЙС, ШОВКОВА КОСИЦЯ

*Leontopodium alpinum* Cass.

Родина Айстрові (Складноцвіті) —  
Asteraceae (Compositae)

**Природоохоронний статус виду**  
Зникаючий.

### Наукове значення

Середньоевропейський гірський вид на пн.  
та сх. межі ареалу.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Високогір'я Піреней, Альп, Балкан і Карпат.  
В Україні — Свидовець (гг. Близниця, Драго-  
брат, Герашаска і Ребро), Чорногора (г. Шпи-  
ці), Мармароські Альпи (г. Ненеска), Чивчини  
(г. Великий Камінь). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

### Чисельність та структура популяцій

Збереглися залишки популяцій у кількох ізо-  
льованих місцезростаннях на малих площах  
(до 0,2 га) у важкодоступних місцях. Чисель-  
ність у чотирьох локалітетах не перевищує  
100, цвітуть окремі особини. У частини по-  
пуляцій не виявлено насінневого підросту.  
Сучасний стан усіх популяцій критичний: чи-  
сельність особин і площа оселищ постійно  
зменшуються. Більшість популяцій, відомих  
на Чорногорі у ХХ ст., зникли.

### Причини зміни чисельності

Як ритуальна й декоративна рослина зни-  
щується населенням і туристами. Фактора-  
ми загрози є низька генетична різноманіт-  
ність, критично низький поріг чисельності,  
повільні темпи онтогенезу і відновлення,  
антропогенний вплив.



### Умови місцезростання

Субальпійський та альпійський пояси в межах  
висот 1450–1800 м н. р. м. Рoste на слабкоза-  
дернованих ділянках і у тріщинах вапнякових  
скель на сухих пд. і пд.-сх. стрімких схилах (по-  
рядок *Potentilletalia caulescentis*) у складі релікто-  
вих угруповань (асоціація *Saxifrago-Festucetum*  
*versicoloris*) та в інших рідкісних фітоценозах  
(асоціація *Festucetum saxatilis*). Мезоксерофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна повстис-  
то опушена рослина 10–25 см заввишки. Сте-  
бла прості, поодинокі, висхідні, біля основи  
з розеткою. Листки цілісні, видовжено- або  
лінійно-ланцетні, чергові, сидячі. Квітки у  
дрібних кошиках, які зібрані по 3–10 на верхів-

ках стебел у щільні головки і оточені кількома  
рядами видовжено-ланцетних, білих від гус-  
того повстистого опушення листків загальної  
обгортки. Крайові квітки у кошику маточкові,  
серединні — двостатеві. Плід — видовжена  
циліндрична сім'янка. Цвіте у червні–липні.  
Розмножується насінням і вегетативно.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється у Карпатському БЗ, Карпат-  
ському НПП, заказнику загальнодержавного  
значення «Чорний Діл» (Чернівецька обл.).  
Необхідний суворий заповідний режим на  
г. Герашасці й Ребрі та охорона місцезростань.  
Слід ширше культивувати та інтродукувати. За-  
боронено збирання рослин, гербаризацію, по-  
рушення структури фітоценозів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у декількох ботанічних садах.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне, ритуальне, ґрунтоутвірне.

### Основні джерела інформації

Кияк, 1999; Малиновський, Крічфалушій, 2002;  
ЧКУ, 1996.

Автори: І.І. Чорней, В.Г. Кияк  
Фото: Н.М. Сичак

