

## ЛЕЩИЦЯ ДНІСТРОВСЬКА

*Gypsophila thyraica* Krasnova  
(*G. altissima* auct. non L.)

Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae

**Природоохоронний статус виду**  
Вразливий.

**Наукове значення**  
Подільська ендемічна раса збірного комплексу *G. altissima* s. l.

**Ареал виду та його поширення в Україні**  
Центральна й пд.-сх. частина Подільської височини. Адм. регіони: Тр, Ів, Хм.

**Чисельність та структура популяцій**  
Відомо кілька ізольованих популяцій на Товтровому кряжі й Середньому Придністров'ї. Популяції малі, приурочені до специфічних відслонень сарматських вапняків та гіпсів на вершинах пагорбів на схилах різної експозиції.

**Причини зміни чисельності**  
Інтенсивне рекреаційне навантаження, витоптування, зникає уздовж стежок і поблизу оглядових площадок на вершинах товтр і гребенів каньйону. Руйнування екотопів унаслідок видобутку вапняку.

**Умови місцезростання**  
На карбонатних відшаруваннях у складі петрофітних варіантів угруповань союзів *Artemisio marschalliani-Elytrigion intermediae*, *Alyso alyssoidis-Sedion albi*, а також оригінальних наскельних ценозів зі співдомінуванням *Gypsophila thyraica* та *Cephalaria uralensis*. Значно рідше трапляється у складі угруповань союзу *Festucion valesiacaе*. Ксерофіт, кальцефіл.



**Загальна біоморфологічна характеристика**  
Хамефіт. Багаторічна каудексна рослина з товстуватим коренем та вкороченими неплідними пагонами. Стебла в кількості 3–4, прямостоячі, 35–80 см заввишки, до суцвіття голі, у суцвітті розсіяно-залозистоопушені. Листки лінійно-ланцетні, 0,9–6 см завдовжки, загострені, з трьома жилками, товстуваті, по краю дрібнопилчасті. Суцвіття волотисте, приквіткові листочки плівчасті, широкояйцеподібні, на верхівці відтягнуті у вістря, по краю розсіяно залозистоопушені, квітконіжки тонкі. Чашечка вузькодзвоникувата, майже до середини розсічена на яйцеподібні зубчики. Пелюстки широко-лопаткоподібні, загострені, білі. Коробочка куляста, насінини відкриті тупими короткими горбочками. Цвіте в

червні–липні, плодоносить у серпні–вересні. Розмножується переважно насінням.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**  
Охороняється у ПЗ «Медобори», НПП «Подільські Товтри». Збереження популяцій можливе лише в умовах заповідання. Необхідний моніторинг популяцій. Заборонено створення нових кар'єрів, ненормована й неконтрольована рекреація в місцях зростання, руйнування місцезростань.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**  
Вирощують у Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

**Господарське та комерційне значення**  
Декоративне, протиерозійне.

**Основні джерела інформації**  
Екофлора, 2002; Заверуха, 1985; Краснова, 1971; ЧКУ, 1996.

Автори: О.О. Кагало, Н.В. Скібіцька, Л.Г. Любінська  
Фото: О.О. Кагало



## СОНЦЕНАСІННИК ТАЄМНИЙ

*Heliosperma arcanum* Zapf.  
(*Ixosa arcana* (Zapf.) Ikonn.)

Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae

**Природоохоронний статус виду**  
Зниклий.

### Наукове значення

Реліктовий ендемічний вид з балканськими флорогенезисними зв'язками.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Вузький подільський ендемічний вид, відомий лише з місця опису (окол. м. Заліщики, Тернопільська обл., с. Хрещатик, Чернівецька обл.), де зростав на крутому лівому березі р. Дністер. На сьогодні вид зник. Адм. регіони: Тр, Чц.

### Чисельність та структура популяцій

Неодноразові спроби віднайти рослини в природі не дали результатів.

### Причини зміни чисельності

Антропогенний вплив: скорочення відкритих площ за рахунок заліснення схилів, вузька стенопотпність виду та слабка конкурентоздатність.



### Умови місцезростання

Раніше вид зростав на кам'янистих схилах в розколинах вапнякових скель в угрупованнях порядку *Alysso-Sedetalia*. Мезоксерофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з опушеними численними надземними вегетативними і плодовими пагонами, 14–16 см заввишки. Нижні листки еліптично-лопаткоподібні до 10 мм завдовжки і 3 мм завширшки, стеблові — вузьколінійні, загострені, 20–30 мм завдовжки і 2–2,5 мм завширшки, з країв густо дрібнозрубчасті, голі, внизу війчасті. Квітки нечисленні, на довгих прямих ніжках; пелюстки бруднобілі, на верхівці зазублені. Плід — коробочка. Час

цвітіння та плодоношення достеменно невідомий.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

У випадку знаходження виду заборонено збирання рослин (гербарізацію), порушення умов місцезростань, заліснення схилів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне, ґрунотвірне.



### Основні джерела інформації

Екофлора України, 2002; Флора УРСР, 1952.

Автор: М.М. Федорончук  
Фото: В.П. Гелюта

## МІНУАРЦІЯ РІДКОКВІТКОВА

*Minuartia pauciflora* (Kit. ex Kanitz) Dvořaková  
(*M. gerardii* auct. non (Willd.) Hayek;  
*M. verna* auct. non (L.) Hierr;  
*M. zarecznyi* (Zapał.) Klokov)

Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae

Природоохоронний статус виду  
Рідкісний.

Наукове значення  
Рідкісний карпатський ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні  
Карпати (Татри, Сх. Карпати). В Україні зрідка трапляється на Свидовецькому, Мармароському масивах та на Чорногорі. Адм. регіон: Зк.

### Чисельність та структура популяцій

Ізольовані популяції (гг. Близниця, Драгобрат, Скуртул, Герашаска, Ненеска, Петрос), невеликі за площею, малочисельні. Сучасний стан, вікова структура не вивчені.

### Причини зміни чисельності

Найбільше потерпає від випасу худоби і надмірного рекреаційного навантаження.

### Умови місцезростання

Росте у субальпійському поясі на вапнякових скелях і вузьких скелястих терасах у складі угруповань порядку *Potentilletalia caulescentis* (кл. *Asplenietea trichomanis*). Трапляється також на осипищах карбонатних порід (порядок *Thlaspietalia rotundifolii*). Карбонатofil, мезофіт.



Загальна біоморфологічна характеристика  
Хамефіт. Напівкущик, 5–15 см заввишки з веретеноподібним коренем. Утворює густі дернинки. Стебла численні, з дугоподібною основи підведені, тонкі, вгорі залозисто-волосисті, безрозеткові. Листки дрібні, цілокраї, лінійнощетиноподібні, лінійно-ланцетні, голі. Квіток 1-3, зібрані у верхівкові напівзонтики. Чашолистки яйцеподібно-ланцетні 3–4 мм завдовжки, 1,2–1,8 мм завширшки, гострі або загострені, з трьома випуклими жилками, по краю широкоперетинчасті. Пелюстки білі, яйцеподібно-еліптичні, яйцеподібні або овальні, трохи довші від чашечки (3,4–6 мм завдовжки), тупі. Цвіте у травні–липні. Плід яйцеподібно-конічна коробочка, 4–5,5 мм завдовжки, розкри-

вається 3–4 стулками. Насінини ниркоподібні, з тупуватими горбочками по периферії. Розмножується насінням та партикуляцією каудексу.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Необхідно взяти під охорону місцезростання на Свидовці, г. Петрос і Мармароських Альпах, контролювати стан популяцій. Відомості про наявність в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду відсутні. Заборонено збирання рослин, порушення умов їх місцезростань.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Відомостей немає.

### Господарське та комерційне значення

Ґрунтоутвірне, протиерозійне.

### Основні джерела інформації

Екофлора України, 2002; Крічфалушій, Будников, Мигаль, 1999; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Попов, 1949; Чопик, 1976.

Автори: І.І. Чорней, М.М. Федорончук  
Фото: Ю.Й. Кобів



## МІНУАРЦІЯ ГОСТРОПЕЛЮСТКОВА

*Minuartia oxypetala* (Wot.) Kulcz. (*Alsine oxypetala* Wot., *Minuartia verna* (L.) Hier subsp. *oxypetala* (Wot.) Halliday)



Родина Гвоздикові — Caryophyllaceae

**Природоохоронний статус виду**  
Рідкісний.

**Наукове значення**  
Вузьколокальний ендемік.

**Ареал виду та його поширення в Україні**  
Покутсько-Мармароські Карпати. В Україні зростає в Чивчинах. Адм. регіон: Ів.

**Чисельність та структура популяцій**  
Представлені ізольовані локальні популяції (вершини г. Будичевська, Чивчин, Чивчинаж, Попадя-Лустон, Гнетеса, Фатія Банулуї) площею до кількох квадратних метрів і чисельністю не більше кількох десятків особин.

**Причини зміни чисельності**  
Вузька еколого-ценотична амплітуда.

**Умови місцезростання**  
Відшарування карбонатних порід, вапня-

кові скелі і осипища в межах верхнього лісового (на межі із субальпійським) поясу. Вид приурочений до угруповань союзу *Cystopteridion* і, зокрема, ендемічної східнокарпатської асоціації *Saxifragetum luteoviridis* та рідкісної у Карпатах асоціації *Festucetum saxatilis* союзу *Festuco saxatilis-Seslerion bielzii* (кл. *Asplenietea trichomanis*). Мезофіт.

**Загальна біоморфологічна характеристика**  
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина із дуже розгалуженими, слабо здерев'янілими біля основи, залозисто опушеними стеблами, 5–12 см заввишки, що утворює дерники. Листки лінійно-щетиноподібні, з країв залозистовійчасті. Квіток на стеблині 1–5, чашолистки яйцеподібно-ланцетні, з трьома жилками;

пелюстки коротші за чашолистки, загострені. Коробочка трохи довша за чашечку. Цвіте у травні–липні, плодоносить у червні–липні. Розмножується насінням.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**  
Конкретні заходи охорони не розроблялися. Потребує виділення заповідних ділянок у місцях зростання виду та контролю за станом популяцій. Заборонено збирання, заготовлю рослин, порушення умов зростання.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**  
Відомостей немає.

**Господарське та комерційне значення**  
Ґрунотвірне, декоративне.

**Основні джерела інформації**  
Екофлора України, 2002; Pawłowski, 1939; Pawłowski, Walas, 1949; Zapałowicz, 1911.

Автори: М.М. Федорончук, І.І. Чорней  
Фото: Ю.Й. Кобів

