

3.5.9 Дворічанський район

Місцева схема екомережі району складається з земельних ділянок Галицько-Слобожанського екокоридору загальнодержавного значення та Оскільського екокоридору місцевого значення. Загальна площа екомережі району становить 5483,2 га.

Галицько-Слобожанський екокоридор загальнодержавного значення

Екокоридор проходить долинами річок Нижня Дворічна та Оскіл, у його складі п'ять ключових територій.

№ 60 «Оскільський»

Ботанічний заказник місцевого значення (зарезервований)

Площа 210,6га

Місце розташування Околиці смт Дворічна

Коротка характеристика Ділянка розташована в місці впадіння рр. Нижня та Верхня Дворічна в р. Оскіл і включає русла цих річок, їх заплави із заплавленими лісами й луками, а також схили правого берега р. Верхня Дворічна зі степовою рослинністю. У рослинному покриві поширені угруповання евідрофітних рослин, вербово-тополевих і вільхових лісів, високотравних та низькотравних прибережноводних ценозів, лучних, чагарникових і справжніх степів. Особливу цінність мають рідкісні угруповання сальвінії плаваючої, латаття білого, глечиків жовтих, ковили волосистої (ЗКУ), мласкавця серповидного, агломераційні угруповання чебрецю вапнякового та родовиково-злакові асоціації (ЗСХ). Раритетна флора представлена 12 видами (ЄЧС, ЧКУ, ЧСХ). У складі фауністичних комплексів низка рідкісних видів хребетних, занесених до ЄЧС (3), ЧКУ (8), ЧСХ (15).

№ 61 «Новомлинський»

Ботанічний заказник місцевого значення (зарезервований)

Площа 60,1га

Місце розташування Поблизу с. Новомлинськ

Коротка характеристика Ділянка розташована на яружно-балкових крейдяних схилах правого берега р. Оскіл. Рослинний покрив утворюють переважно угруповання кретофільних видів гісопа крейдяного, чебрецю вапнякового, переломника Козо-Полянського, полину суцільнобілого, мласкавця серповидного та льону українського, які занесені до ЗСХ, поширена також формація ковили волосистої (ЗКУ). Раритетна флора представлена 32 видами: 7 видів із ЄЧС, 5 видів із ЧКУ та 20 видів із ЧСХ. На території представлені фауністичні комплекси крейдяних відслонень.

№ 62 «Червоний»

Ботанічний заказник місцевого значення

Площа 49,8га

Місце розташування Біля с. Перше Красне

Коротка характеристика В яружно-балковій системі на крейдяних схилах правого берега р. Оскіл поширені реліктові та ендемічні види рослин. У рослинному покриві представлені ценози із ЗКУ: формації ковили волосистої, к. Лессінга, півонії тонколистої, осоки низької та три формації із ЗСХ. У складі флори багато рідкісних видів: переломник Козо-Полянського, дрік донський (ЄЧС), 5 видів, занесених до ЧКУ та 16 видів – до ЧСХ.

№ 63 «Озерний»**Ботанічний заказник місцевого значення**

Площа 44,0га

Місце розташування Кам'янське лісництво, кв. 16, 17, поблизу с. Піски

Коротка характеристика Комплекс заплавлених фітоценозів в урочищі „Озерне”: вільшаники, осокірники, діброва, справжні та заболочені луки, прибережно-водні і водні ценози з участю видів рослин, рідкісних для флори Харківщини. Поширені формації реліктових видів – латаття білого і глечиків жовтих, що включені до ЗКУ, та рябчиково-різнотравно-злакової угруповання (ЗСХ). У складі рідкісної флори 6 видів із ЧКУ та ЧСХ.

№ 64 «Жонопляне»**Ботанічний заказник місцевого значення**

Площа 315,9га

Місце розташування Біля сс. Тополі, Кам'янка

Коротка характеристика Унікальний рефугіум рідкісних та зникаючих угруповань крейдяних степів, занесених до ЗКУ (формації ковили Лессінга, к. волосистої, к. пухнатолистої, осоки низької). У рослинному покриві поширені 6 угруповань, занесених до ЗСХ. На території зростають ендемічні та реліктові кретофільні види із ЄЧС – гісоп крейдяний, переломник Козо-Полянського, дрід донський, полин суцільнобілий, ранник крейдяний, смілка крейдяна, 4 види із ЧКУ, 7 видів із ЧСХ. Переважна більшість цих видів домінують у трав'яному покриві.

Оскільський екокоридор місцевого значення

Екокоридор проходить долиною р. Оскіл, у його складі дві ключові території.

№123 «Коробочкине»**Ботанічний заказник місцевого значення**

Площа 29,1га

Місце розташування Біля смт Дворічна

Коротка характеристика В яружно-балковій системі правого берега р. Оскіл представлена унікальна для Харківщини рослинність крейдяних відслонень. Рідкісні ценози представлені 2 степовими формаціями (ЗКУ) та 5 крейдяними угрупованнями (ЗСХ). У складі раритетної флори 6 видів, занесених до ЄЧС, 8 – із ЧКУ та 6 – із ЧСХ.


№124 «Крейдяний»**Ботанічний заказник місцевого значення**

Площа 36,9га

Місце розташування Біля смт Дворічна

Коротка характеристика На схилах ярів і балок правого берега р. Оскіл охороняється своєрідна рослинність справжніх, чагарникових і крейдяних степів. У складі флори багато рідкісних, ендемічних і реліктових кретофільних видів рослин. Серед них є занесені до ЄЧС – гісоп крейдяний, переломник Козо-Полянського, пирій ковилолистий, ранник крейдяний, смілка крейдяна, 5 видів рослин – із ЧКУ; 13 видів – із ЧСХ. Зустрічаються зникаючі в Україні формації двох видів ковили (ЗКУ) та 5 рослинних угруповань із ЗСХ.

СХЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ДВОРІЧАНСЬКОГО РАЙОНУ



Територіальні структури екомережі

II. Галицько-Слобожанський екокоридор загальнодержавного значення

VIII. Оскільський екокоридор місцевого значення

Структурні елементи екомережі

Ключові території

території природно-заповідного фонду