

### 3.5.18 Куп'янський район

Місцева схема екомережі району складається із земельних ділянок Оскільського та Балаклійсько-Синихінського екокоридорів місцевого значення, загальна площа екомережі району – 6625,4 га

#### *Оскільський екокоридор місцевого значення*

Екокоридор проходить долиною р. Оскіл, у його складі три ключові території.

##### **№ 120 «Пристін»**

##### **Гідрологічний заказник місцевого значення (зарезервований)**

Площа 898,7га

Місце розташування Між с. Петрівка та с. Пристін

**Коротка характеристика** На території – у затоці та на берегах Червонооскільського водосховища – поширені угруповання водних, прибережних і лучних екосистем. У рослинному покриві відмічені формації латаття білого і глечиків жовтих (ЗКУ), лепехи звичайної (ЗСХ), популяції рябчика малого (ЧКУ) та 3 видів, занесених до ЧСХ. У складі орнітокомплексів представлені рідкісні види із ЄЧС (деркач), ЧКУ (журавель сірий), ЧСХ (бугай, бугайчик, чепура велика, чапля руда, лебідь-шипун, лунь лучний, сова болотяна, рибалочка, синиця вусата). Під час сезонних міграцій у затоці зупиняються для відпочинку і годівлі численні зграї водно-болотних птахів (гуси, качки, мартини, крячки, кулики).

##### **№ 121 «Калинівський»**

##### **Ботанічний заказник місцевого значення (зарезервований)**

Площа 38,6га

Місце розташування Околиці сс. Калинове, Голубівка

**Коротка характеристика** На правому березі р. Оскіл на плакорній та лобній частині крутого схилу представлена рослинність справжніх типчакowo-ковилово-різнотравних і чагарникових степів з фрагментами реліктових угруповань. Нижче, на оголеній крейді, зростають рідкісні для області розріджені чагарничкові угруповання ендемічних зникаючих видів, включених до ЧКУ. У заплаві домінує типова інтразональна лучна та водно-болотна рослинність. У старицях з відкритим водним дзеркалом трапляються рідкісні ценози латаття білого і глечиків жовтих. Раритетна фітобіота нараховує 7 рослинних угруповань (ЗКУ, ЗСХ) та 16 видів рослин (ЧКУ, ЧСХ).

##### **№ 122 «Червонооскільське водосховище»**

##### **Водно-болотне угіддя**

Площа 2326,0га

Місце розташування Між с. Петрівка та с. Хомине

**Коротка характеристика** Водно-болотне угіддя є одним з найбільших у Харківській області штучних проточних прісних водосховищ і головним об'єктом водопостачання Харківської та Донецької областей. В акваторії водосховища поширені справжні водні ценози, у прибережній смузі зростають вербняки, вільшняки, високотравні угруповання з очерету звичайного, видів рогозу, видів схеноплекта та осоки. По берегах та в заплаві р. Оскіл у верхів'ї водосховища – заболочені та справжні луки з різнотравно-злаковими й різнотравно-осоковими угрупованнями. У складі раритетної фітобіоти 9 рослинних угруповань (ЗКУ, ЗСХ) та 12 видів рослин (ЧКУ, ЧСХ). Особливу екологічну цінність територія Червонооскільського водосховища відіграє в збереженні видового різноманіття і

кількісного багатства птахів. У складі орнітокомплексів представлені раритетні види із ЄЧС, ЧКУ (деркач, орлан-білохвіст, журавель сірий) та ЧСХ (бугай, бугайчик, чепура велика, чапля руда, лебідь-шипун, лунь лучний, сова болотяна, рибалочка). Територія водосховища є важливим міграційним коридором, місцем зупинки для відпочинку і годівлі численних зграй перелітних птахів (гуси, качки, мартини, крячки, кулики, соколоподібні), серед яких зустрічаються рідкісні види із ЄЧС, ЧКУ (гоголь, кулик-довгоніг, кулик-сорока, кульон великий). Лісові масиви по берегах водосховища служать міграційними шляхами для птахів чагарниково-лісового комплексу. В угідді мешкає видра річкова (ЄЧС, ЧКУ).

### *Балаклійсько-Синихінський екокоридор місцевого значення*

Екокоридор проходить долиною р. Синиха, у його складі одна ключова територія.

#### **№ 131 «Сеньківський»**



#### **Гідрологічний заказник місцевого значення (зарезервований)**

**Площа 230,3га**

**Місце розташування** Околиці с. Сенькове

**Коротка характеристика** Типовий заплавний лучний і водно-болотний комплекс у затоці Червоносільського водосховища та заплаві р. Синиха. У рослинному покриві представлені фрагменти рідкісних угруповань – латаття білого (ЗКУ) та молочки приморської (ЗСХ). У складі гніздової орнітофауни раритетні види із ЄЧС (деркач), ЧКУ (журавель сірий, коловодник ставковий), 14 видів із ЧСХ, серед яких бугай, бугайчик, лебідь-шипун, лунь лучний, чепура велика, чапля руда. Тут розташована колонія чаплі сірої. Місце зупинки для відпочинку і годівлі перелітних птахів (гуси, качки, лебеді, пастушкові, чаплі, мартини, кулики, крячки).

# СХЕМА ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ КУП'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ



## Територіальні структури екомережі

- VIII.** Оскільський екокоридор місцевого значення
- IX.** Балаклійсько-Синихінський екокоридор місцевого значення

## Структурні елементи екомережі

### Ключові території

- території природно-заповідного фонду
- водно-болотні угіддя