

3.5.23 Сахновщинський район

Місцева схема екомережі району складається з земельних ділянок Орільського екокоридору місцевого значення. Загальна площа екомережі району – 4542,9 га.

Орільський екокоридор місцевого значення

Екокоридор проходить долинами р. Оріль та р. Орілька і має у своєму складі чотири ключові території.

№ 84 «Заплава р. Оріль»

Водно-болотне угіддя

Площа 1785,0га

Місце розташування Між сс. Багата Чернечина, Малі Бучки

Коротка характеристика Територія угіддя включає заплаву р. Оріль із водними, заболоченими та засоленими ділянками. Русло р. Оріль звивисте з заболоченими берегами, місцями з'язьовими мілинами. У заплаві велика кількість старичних озер. Значну площу займають схеноплектово-рогозово-очеретяні плавні та болота (осокові, осоково-бульбокомишеві). ВБУ має велике значення для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. У складі орнітокомплексів представлені рідкісні види із ЄЧС (1), ЧКУ (3), ЧСХ (14). Тут селиться журавель сірий, лебідь-шипун, лунь лучний, сова болотяна. На території розташовані численні колонії крячків (к. білокрилий, к. білощокий, к. чорний, к. річковий), куликів (6 видів, серед яких кулик-довгоніг із ЧКУ, грицик великий, пісочник малий із ЧСХ), чапель (чепура велика, ч. мала, чапля руда, квак), поселення очеретянки індійської. В угідді численні поселення гуски сірої та качок. Як кормові угіддя заплаву використовують лелеки. В міграційний період в заплаві зупиняються для відпочинку і годівлі численні зграї птахів водно-болотного комплексу.

№ 85 «Багаточернечинський»

Орнітологічний заказник місцевого значення

(зарезервований)

Площа 522,2га

Місце розташування Околиці сс. Багата Чернечина, Малі Бучки

Коротка характеристика Ділянка заплави р. Оріль у місці впадіння р. Багата. Унікальний комплекс галофітних, лучно-болотних та водних екосистем. У складі орнітокомплексу раритетні види із ЄЧС (деркач), ЧКУ (кулик-довгоніг), ЧСХ (12 видів). На території розташовані поселення крячків (к. білокрилий, к. білощокий, к. чорний), куликів (6 видів), чепури великої, лебедя-шипуна, гуски сірої, очеретянки індійської. Місце концентрації численних зграй водоплавних та навколотовних птахів під час прольотів. На території представлені засолені луки з рідкісними для області галофітними угрупованнями (формація кермека донецького, полину сантонінського тощо) та різноманітною флорою, у складі якої 2 види із ЧКУ та 4 – із ЧСХ.

№ 86 «Аполлонівський»

Орнітологічний заказник місцевого значення

(зарезервований)

Площа 137,8га

Місце розташування Між сс. Аполлонівка та Андріївка

Коротка характеристика У заплаві р. Оріль поширені угруповання справжніх, болотистих і засолених луків та водно-болотної рослинності. У складі орнітокомплексів представлені рідкісні види із ЄЧС (деркач) та ЧСХ (чепура велика, чапля мала, ч. руда, квак, бугай, бугайчик, лебідь-шипун). Це місце міграційних скупчень гусей, качок, куликів, крячків, чапель та інших груп птахів. На території поширені рідкісні для Харківщини рослинні угруповання засолених луків: формації полину сантонінського, молочки приморської, кермека донецького, рогузу Лаксманового, а також 5 рідкісних видів рослин, серед яких два зростають на північній межі ареалу.

**№ 88 «Заплава р. Оріль»
Водно-болотне угіддя**

Площа 660,0 га

Місце розташування Околиці сс. Аполлонівка, Степанівка, Андріївка

Коротка характеристика Територія угіддя включає частину заплави з водними, заболоченими та засоленими ділянками, численними старичними озерами. Русло р. Оріль звивисте з заболоченими берегами та грязьовими мілинами. Поширені схеноплектово-рогозово-очеретові плавні, осокові та бульбокомишеві болота. Раритетна фітобіота представлена 5 галофітними видами та 5 угрупованнями, рідкісними на Харківщині. У складі орнітокомплексів рідкісні види із ЄЧС (1), ЧКУ (2), ЧСХ (15). В угідді розташовані колонії чапель (чепура велика, ч. мала, чапля руда, квак), куликів (5 видів, серед яких грицик великий та пісочник малий із ЧСХ), мартина звичайного, крячків (к. чорний, к. білокрилий), поселення лебедя-шипуня, гуски сірої, луня лучного, сови болотяної. Тут гніздиться очеретянка індійська (рідкісний вид горобцеподібних птахів). Ділянка заплави є важливим вузлом годівлі і місцем відпочинку численних зграй птахів водно-болотного комплексу під час весняного й осіннього прольоту. В угідді зустрічається видра річкова (ЄЧС, ЧКУ).

