

## ШАФРАН ПАЛЛАСА

*Crocus pallasii* Goldb. (*C. autumnalis* Pallas ex M.Bieb. 1808, non Poir. 1804; *C. pallasianus* Herb.)

Родина Півникові — Iridaceae

Природоохоронний статус виду  
Вразливий.

### Наукове значення

Східносередземноморський вид на пн. межі ареалу.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Сх. узбережжя Середземного моря, Балкани, Крим, Мала Азія. В Україні зростає в Криму. Адм. регіон: Кр.

### Чисельність та структура популяцій

Популяції в степовій частині (Тарханкутський п-ів, ур. Джангуль, окол. м. Євпаторії, Саки), в передгір'ї (окол. м. Сімферополя, Севастополя: Сапун-гора, Саур-могила, Старий Крим) та в сх. частині пд. берега (окол. м. Судак, смт Коктебель, Кара-Даг) відносно чисельні, в основному представлені значною кількістю особин, але в умовах господарської діяльності зазнають негативних змін.

### Причини зміни чисельності

Антропогенне навантаження — масове збирання рослин на букети і як лікарську сировину, випасання худоби.



### Умови місцезростання

Зростає на степах, горбах, узліссях, кам'янистих схилах в угрупованнях кл. *Festuco-Brometea* та *Quercetea-pubescenti-petraeae*. Ксеромезофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Осінній ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 8–16 см заввишки. Бульбоцибулина сплюснутакуляста, з сітчастоволокнистими зовнішніми оболонками. Прикореневі листки вузьколінійні, розвиваються восени наприкінці цвітіння. Квітки великі, 4–4,5 см у діаметрі, рожево-бузкові, у зіві жовті. Цвіте у жовтні–листопаді, плодоносить у листопаді. Розмножується насінням та бульбоцибулинами.

### Режим збереження популяцій та заходи охорони.


Охороняють у Карадазькому ПЗ і «Джангульському» заказнику, а також у заказниках місцевого значення. Заборонено збирання квітів на букети, викопування цибулин, випасання худоби.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Нікітському ботанічному саду ННЦ УААН та в Центральному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне, лікарське, харчове.



### Основні джерела інформації

Дидух, Шеляг-Сосонко, 1982; Каталог редких, исчезающих ..., 1975; Крюкова, Лукс, Привалова, 1980; Миронова, Каменских, 1995; Миронова, Шатко, 1987; Редкие растения и животные Крыма. Справочник, 1988; Редкие и исчезающие растения и животные Украины. Справочник, 1988; Скворцова, 1973; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978.

Автори: М.М. Федорончук, О.Ю. Уманець  
Фото: В.В. Савчук



## ШАФРАН СІТЧАСТИЙ

*Crocus reticulatus* Steven ex Adams (*C. luteus* M.Bieb., nom. illeg., *C. variegatus* Hoppe et Hornsch.)

Родина Півникові — Iridaceae

**Природоохоронний статус виду**  
Неоцінений.

### Наукове значення

Субсередземноморсько-малоазійський вид на пн.-сх. межі ареалу.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Поширений у Центральній Європі, Середземномор'ї, Передкавказзі, пн. частині Зх. Закавказзя, Малої Азії. В Україні — Правобережний і Лівобережний Лісостеп, Степ. Адм. регіони: Кв, Чн, См, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

### Чисельність та структура популяцій

Популяції локальні, стрічкового типу, численні, повночленні. На Донецькому кряжі мають площу від 2 до 45 га з середньою щільністю 13–15 особин на м<sup>2</sup>.

### Причини зміни чисельності

Розорювання земель, надмірне випасання, рекреаційне навантаження, зривання на букети, весняне випалювання степів, вирубування лісів.

### Умови місцезростання

На степових схилах балок і річкових долин, серед чагарників, на узліссях та в дібровах (кл. *Quercus-Fagetae*). Характерний елемент степових угруповань кл. *Festuco-Brometea*. Повночленні популяції формуються переважно в лучно-степових угрупованнях союзу *Fragario viridis-Trifolion montani*. На справжніх



степях союзу *Astragalo-Stipion* великі популяції не формуються, а на степових пасовищах (союз *Festucion valesiacaе*) трапляються поодинокі особини. Мезофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Весняний ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 8–30 см заввишки. Бульбоцибулина з грубосітчасто-волокнистими, нерідко розірваними оболонками. Листки (3–4) вузькі, шилоподібні, з'являються одночасно з квітками і після цвітіння дуже видовжуються. Покривало 2–3-листе. Квітки білі або блідофіалкові з ніжно-бузковими смужками, приймочка жовтогаряча. Цвіте у березні–квітні. Плодоносить у травні–червні. Розмножується бульбоцибулинами та насінням.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняють в Луганському, Українському степовому, Дніпровсько-Орільському, «Єланецький Степ» ПЗ, НПП «Гомольшанський», «Святі Гори», РЛП, заказниках та пам'ятках природи загальнодержавного та місцевого значення. Необхідно виявляти нові місцезнаходження з метою їх охорони, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено розорювання степів, надмірний випас, збирання рослин, весняне випалювання степів, вирубування лісів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у ботанічних садах та на присадибних ділянках.


### Господарське та комерційне значення

Декоративне.

### Основні джерела інформації

Байрак, Стецюк, 2005; Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, 1981; Кондратюк, Остапко, 1990; Кучеревський, 2001; Остапко, 2001; Перегрим, 2004; Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, культивируемые в ботанических садах и других интродукционных центрах страны, 1983; Тарасов, 1983; ЧКУ, 1996.

Автори: І.А. Коротченко, М.М. Перегрим  
Фото: М.М. Перегрим





## ШАФРАН ГАРНИЙ

*Crocus speciosus* M.Bieb.

Родина Півникові — Iridaceae

**Природоохоронний статус виду**  
Вразливий.

### Наукове значення

Евксинсько-гірканський вид на пн. межі ареалу.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Крим, Кавказ, Мала Азія, пн. Іран. В Україні — головне пасмо Кримських гір, Керченський п-ів. Адм. регіон: Кр.

### Чисельність та структура популяцій

Популяції локальні з контагіозною просторовою структурою. Щільність окремих скупчень понад 30 різновікових особин на 1 м<sup>2</sup>, проте кількість генеративних рослин незначна, віковий спектр повночленний, лівосторонній, популяції інвазійного типу. Відтворення популяцій здійснюється переважно вегетативним шляхом. Популяції стійкі, мають високу життєздатність.

### Причини зміни чисельності

Низький рівень насінневого поновлення популяцій, низька конкурентоспроможність сходів, надмірне рекреаційне навантаження, збирання на букети, викопування бульбоцибулин.

### Умови місцезростання

Має широку екологічну амплітуду. Яйли та лісовий пояс (трав'янисті і кам'янисті схили, узлісся, рідколісся, галявини, чагарники). Ксеромезофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Весняний ефемероїд. Багаторічна



трав'яна рослина 10–40 см заввишки. Бульбоцибулина зі шкірястою оболонкою, що розпадається на кільця, нерідко з придатковими бульбочками біля основи. Листків 2–4, лінійних, що розвиваються після цвітіння наступної весни, досягаючи 40 см завдовжки і 6–8 мм завширшки. Квітки 4–6 см завдовжки, лілові, біля основи з пурпуровою сіткою. Приймочка розсічена, рожева. Цвіте у вересні–жовтні. Вперше зацвітає на 5 рік після проростання. Розмножується насінням і вегетативно бульбоцибулинами.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Охороняється у Ялтинському гірсько-лісовому та Кримському ПЗ, а також на тери-


торії пам'ятки природи загальнодержавного значення «Каратау». Рекомендовано моніторинг популяцій, введення в культуру, вирощування в ботанічних садах, дотримання заповідного режиму природоохоронних територій. Заборонено збирання рослин, порушення умов зростання, випас, рекреацію.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Нікітському ботанічному саду — ННЦ УААН, ботанічних садах Донецькому, Національному ім. М.М. Гришка НАН України та ін.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне.



### Основні джерела інформації

Определитель высших растений Крыма, 1972; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Парфенов, Чопик и др., 1980.

Автори: В.В. Новосад, В.Г. Собко  
Фото: В.П. Ісіков



## ШАФРАН КРИМСЬКИЙ

*Crocus tauricus* (Trautv.) Puring (*C. adamii* auct. non J.Gay; *C. biflorus* auct. non Mill.)

Родина Півникові — Iridaceae.

**Природоохоронний статус виду**  
Вразливий.

### Наукове значення

Східносередземноморський вид з обмеженим поширенням.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Зх. Закавказзя (район Новоросійська) і Крим (в передгір'ї) — від Севастополя до Сімферополя, окол. м. Старий Крим, Феодосія, та в Гірському Криму (Ай-Петринська, Бабуган, Демерджи, Нікітська яйли), на Керченському п-ві, а також на косі Бірючий острів. Адм. регіони: Хс, Кр.

### Чисельність та структура популяцій

У Криму, зокрема у гірській частині, популяції чисельні, повночленні, в інших місцях представлені поодинокими особинами.

### Причини зміни чисельності

Антропогенний вплив (зривання на букети, випасання худоби, зміна природних еко-



пів внаслідок розорювання земель, штучне заліснення).

### Умови місцезростання

На відкритих кам'янистих та трав'янистих схилах, галявинах, переважно на яйлах і прилеглих до них схилах, в угрупованнях кл. *Festuco-Brometea*. Мезофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Геофіт. Весняний ефемероїд. Багаторічна трав'яна рослина 10–25 см заввишки. Бульбоцибулина з в'їчасто-зубчастим краєм кільцеподібної частини шкірястих оболонок. Листки (3–4) вузьколінійні, з білою смужкою. Покривало дволисте. Оцвітина біла або фіолетова, зовні з темнофіолетови-

ми смужками. Цвіте з кінця лютого до середини квітня, плодоносить у червні. Розмножується насінням і бульбоцибулинами.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Необхідне дослідження популяцій. Охороняють у Кримському та Ялтинському гірсько-лісовому ПЗ. Заборонено збирання рослин, викопування цибулин, витоптування.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у декількох ботанічних садах.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне.

### Основні джерела інформації

Каталог рідких, исчезающих и уничтожаемых растений флоры Крыма, рекомендуемых для заповедной охраны, 1975; Крюкова, Лукс, Привалова, 1980; Редкие растения и животные Крыма. Справочник, 1988; Скворцова, 1973; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978.

Автор: М.М. Федорончук  
Фото: В.В. Савчук

