

## ОЧКИ ГЛАДЕНЬКІ

*Biscutella laevigata* L. s.l. (incl. *B. laevigata* L. subsp. *austriaca* (Jord.) Mach.-Laur.; *B. laevigata* L. subsp. *hungarica* Soó)

Родина Капустяні (Хрестоцвіті) —  
Brassicaceae (Cruciferae)

**Природоохоронний статус виду**  
Рідкісний.

**Наукове значення**  
Гірський вид з диз'юнктивним ареалом.

**Ареал виду та його поширення в Україні**  
Європейський вид, поширений у високогір'ї Альп, Балкан та Карпат. В Україні — Свидовець (гг. Драгобрат, Близниця), де поширений окремий підвид (subsp. *austriaca*). Адм. регіон: Зк.

**Чисельність та структура популяцій**  
Віковий спектр популяцій повночленний, проте розміри їх малі (декілька десятків кв. м), а кількість обмежена. Щільність популяцій 5–10 особин на 1 м<sup>2</sup>.

**Причини зміни чисельності**  
Природна обмеженість відповідних субстратів та екоотопів.

**Умови місцезростання**  
Субальпійський пояс на висоті 1600–1800 м н. р. м., на схилах пд. експозиції, на вапня-



кових відшаруваннях й осипищах, в асоціації *Cystopteridetum fragilis* (кл. *Asplenietea trochomanes*). Кальцефіл, мезофіт.

**Загальна біоморфологічна характеристика**  
Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина з глибокою стрижневою кореневою системою, більш чи менш численними гілками каудекса й напіврозетковими надземними пагонами 15–35 см заввишки. Більшість листків зосереджена у прикореневій розетці, вони видовжено-лопаткоподібні, з дрібнозубчастим краєм; стеблові листки нечисленні, лінійні, редуковані. Китицеподібні суцвіття верхівкові, квітки з жовтим віночком. Плоди — характерні стручечки, ширші, ніж довші, плоскі, зверху й унизу виімчасті

й з помітним крилом по краю. Цвіте у липні, плодоносить у серпні. Розмноження виключно насіннєве.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**  
Охороняється у Карпатському БЗ. Доцільно встановити моніторинг популяцій виду. Заборонено збирання рослин, заготівлю, порушення умов місцезростання.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**  
Відомостей немає.

**Господарське та комерційне значення**  
Декоративне.



**Основні джерела інформації**  
Малиновський, Крічфалушій, 2002; Малиновський, Царик, Кияк, Нестерук, 2002; Чопик, 1976.

Автор: С.М. Зиман  
Фото: О.О. Кагало



## КАПУСТА КРИМСЬКА

*Brassica taurica* (Tzvelev) Tzvelev (*B. sylvestris* (L.) Miller subsp. *taurica* Tzvelev; *B. sylvestris* auct. non (L.) Mill.; *B. incana* auct. non Ten.)

Родина Капустяні (Хрестоцвіті) —  
Brassicaceae (Cruciferae)

**Природоохоронний статус виду**  
Зникаючий.

### Наукове значення

Реліктовий вид. Потребує подальших таксономічних досліджень.

### Ареал виду та його поширення в Україні

Кримський ендемік. Поширений на Пд. березі Криму (центральна частина). Адм. регіон: Кр.

### Чисельність та структура популяцій

Відомий лише з трьох локалітетів: г. Аю-Даг (основний), мис Март'ян та Кучук-Ламбат (окол. смт. Новий Маяк). Основна, найбільша популяція виду виявлена на Аю-Дазі у 1967 р., представлена майже двома сотнями особин переважно дефінітивного стану; популяція біля Кучук-Ламбат (мабуть вторинного походження; виявлена в 1996 р.) включає 2 особини дефінітивного стану та біля двох десятків — віргінільного; на мисі Март'ян відома одна особина (виявлена у 1976 р.), яка, можливо, вже зникла.

### Причини зміни чисельності

Вузька еколого-ценотична амплітуда, яка лімітується як природними (слабка конкурентна здатність виду, недостатнє насіннєве відтворення), так і антропогенними чинниками, зокрема порушенням екоотопів внаслідок великого рекреаційного навантаження.

### Умови місцезростання

Росте на скелях нижньої частини сх. схилу



г. Аю-Даг у місцях накопичення у невеликій кількості ґрунту і значною кількістю щебенистого рухляку та на кам'янистих осипищах морського узбережжя. Ксеромезофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Хамефіт. Напівкущик 1–1,5 м заввишки (у стані плодоношення) з більш-менш здерев'янілим при основі і дуже потовщеним стеблом і зимуючими розетками листків. Трав'яна частина стебла прямостояча або висхідна, вгорі розгалужена, густо опушена (разом з черешками) дрібними простими, назад відхиленими волосками. Листки трохи м'ясисті, розеткові — черешкові, ліроподібні, верхні — цілокраї, з заокругленою верхівкою, розсіяно опушені короткими простими

волосками. Квітки жовті, зібрані в багатоквіткові китиці, спочатку досить щільні, при плодах видовжені до 10–15 см завдовжки. Плід голий розкривний стручок. Цвіте у травні-липні, плодоносить у кінці липня — на початку вересня. Розмножується насінням.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони

Занесений до Європейського червоного списку, Додатку Бернської конвенції. Охороняється у ПЗ «Мис Март'ян» та заказнику загальнодержавного значення «Аю-Даг». Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують у Центральному НАН України ім. М.М. Гришка і Нікітському — ННЦ УААН ботанічних садах.

### Господарське та комерційне значення

Декоративне, селекційне, ґрунтовірне.

### Основні джерела інформації

Голубев, Маслова, 1985; Екофлора України, 2007; Косых, Усачева, 1986; Крайнюк, 1988; Красная книга СССР, 1984; Редкие растения и животные Крыма, 1988; Рыфф, 2000; Цвелев, 1969; ЧКУ, 1996.

Автори: А.П. Ільїнська, Я.П. Дідух  
Фото: Т. Вініченко





## ЖЕРУХА ГРЕЦЬКА

*Cardamine graeca* L.

Родина Капустяні (Хрестоцвіті) —  
Brassicaceae (Cruciferae).

**Природоохоронний статус виду**  
Вразливий.

### Наукове значення

Східносередземноморський елемент з  
диз'юнктивним ареалом, на пн.-сх. межі по-  
ширення.

### Ареал виду та його поширення в Україні


Від о-ва Корсика й Апеннінського п-ва до  
Криму, Балкан, Малої Азії, Сирії та Тунісу.  
В Україні — у Гірському Криму: від долин  
Ласпі та Байдарської до смт. Массандра. Вка-  
зівки щодо зростання виду в Українських  
Карпатах помилкові. Адм. регіон: Кр.

### Чисельність та структура популяцій

Нестабільна, спостерігається тенденція до  
скорочення, але за сприятливих умов (дос-  
татньої кількості вологи) чисельність рос-  
лин може збільшуватися.

### Причини зміни чисельності

Стенотопність, низька конкурентна спро-  
можність, особливості розмноження виду,  
руйнування природних місць зростання,  
рекреаційне навантаження.



### Умови місцезростання

Затінені скелі, гірські ліси, до 1150 м н. р. м.  
Свіжі ліси союзу *Carpinio orientalis-Quercion*  
*pubescentis* (кл. *Quercetea pubescenti-*  
*petraeae*). Мезофіт.

### Загальна біоморфологічна характеристика

Гемікриптофіт. Однорічна, зрідка дворічна  
трав'яна, гола або зрідка розсіяно в'ячисто  
опушена рослина 5–20 см заввишки. Стеб-  
ло прямостояче або висхідне, розгалуже-  
не. Листки пірчасті із пірчаторозсіченими  
сегментами й заокругленими лопатями. Пе-  
люстки білі, 3 (4)–6 мм завдовжки. Стручки  
цупкі, ланцетно-лінійні, загострені з обох  
боків, 4–6 см завдовжки, 2–3 мм завширш-  
ки; стовпчик з боків крилатий, 4–6 (зрідка

1–3) мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні.  
Плодоносить у червні–липні. Розмножуєть-  
ся насінням.

### Режим збереження популяцій та заходи з охорони.

Охороняється в Ялтинському гірсько-  
лісовому ПЗ. Необхідно постійно конт-  
ролювати стан популяцій, особливо на ту-  
ристичних маршрутах, розширити мережу  
заповідних територій. Заборонено рубки,  
освітлення лісів.

### Розмноження та розведення у спеціально створених умовах

Вирощують в Нікітському ботанічному  
саду — ННЦ УААН.


### Господарське та комерційне значення

Відомостей немає.

### Основні джерела інформації

Голубев, 1996; Екофлора України, 2007; Флора  
європейської частини СРСР, 1979; ЧКУ, 1996; Atlas  
Florae Europaeae, 1994; Flora Europaea, 1993; Med-  
Checklist, 1986.

Автор: А.П. Ільїнська  
Фото: В.П. Ісіков



## ЖЕРУХА НІЖНА

*Cardamine tenera* S.G. Gmelin ex C.A. Meyer  
(*C. uliginosa* M. Bieb. subsp. *tenera* (S.G. Gmelin ex C.A. Meyer) Schmalh.)



Родина Капустяні (Хрестоцвіті) —  
Brassicaceae (Cruciferae)

**Природоохоронний статус виду**  
Зникаючий.

**Наукове значення**  
Кримсько-колхідсько-гірканський релікт.

**Ареал виду та його поширення в Україні**  
Крим, Закавказзя, Іран (пн.). В Україні зростає в Криму (підніжжя г. Демерджі та Вел. Чу-чель). Адм. регіон: Кр.

**Чисельність та структура популяцій**  
Формує локальні малочисельні популяції або трапляється поодинокі.

**Причини зміни чисельності**  
Реліктовість, вузька еколого-ценотична амплітуда, слабка конкурентна здатність виду.

**Умови місцезростання**  
Зростає на сирих місцях у широколистяних (переважно букових) тінистих лісах до середнього гірського поясу Криму. Сціофіт, мезофіт.


**Загальна біоморфологічна характеристика**  
Гемікриптофіт. Короткокореневищний багаторічник 10–30 см заввишки. Стебло висхідне, майже не розгалужене, тонке, голе. Листки нижні пірчасто-1-3(4)-парні з майже сидячими цілокраїми листочками; верхній — значно більший, з клиноподібною основою; всі листки опушені дуже дрібними розсіяними простими волосками. Квітки великі, білі або лілові (зрідка), зібрані у рідкі малоквіткові китиці.

Плід — стручок, 30–40 мм завдовжки. Цвіте у квітні–травні (червні). Плодоносить у травні–липні. Розмножується переважно вегетативно, рідше насінням.

**Режим збереження популяцій та заходи з охорони**  
Охороняється на території Кримського ПЗ. Необхідний контроль за станом популяцій та охорона всіх місцезнаходжень виду. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, рубку лісів.

**Розмноження та розведення у спеціально створених умовах**  
Відомостей немає.

**Господарське та комерційне значення**  
Декоративне.



**Основні джерела інформації**  
Голубев, 1996. ; Голубев, Ена, Сазонов 1999; Екофлора України, 2007; Cullen, 1966.

Автор: А.П. Ільїнська  
Малюнок: І.В. Маханьков